

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## FOSTAMATINIB

### Nombre de su medicamento

Nombre genérico — fostamatinib (FOS-tuh-MA-tih-nib)

Nombre de marca — Tavalisse® (TA-vah-lees)

### Usos comunes

Fostamatinib se usa para tratar pacientes adultos con trombocitopenia inmune crónica (ITP).

Fostamatinib también se puede usar para otros tratamientos.

### Dosis y administración

Es importante tomar fostamatinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de fostamatinib es 100 miligramos (100 mg) a 150 miligramos (150 mg) tomados por boca dos veces al día.
- Fostamatinib se puede tomar con o sin comida, pero a la misma hora cada día.
- Fostamatinib debe tomarse entero y no triturado, cortado o disuelto. Si usted no puede tragar fostamatinib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre posibles opciones.
- Si olvida tomar una dosis de fostamatinib, **no** tome una dosis adicional o dos dosis al mismo tiempo. Simplemente, tome la próxima dosis a la próxima hora programada regularmente.
- Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.

### Almacenamiento y manejo

Maneje fostamatinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde fostamatinib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga fostamatinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- Deje fostamatinib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- Cuando sea posible, administre fostamatinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra fostamatinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
  1. Lávese las manos con jabón y agua.
  2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
  3. Cuidadosamente transfiera fostamatinib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
  4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
  5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## FOSTAMATINIB

6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
  7. Lávese las manos con jabón y agua.
- Si usa un organizador diario o recordatorio para su medicamento, debe usar uno separado para fostamatinib. **No** mezcle otros medicamentos con fostamatinib. La persona que llenará el organizador diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el organizador diario o recordatorio). Cuando esté vacío, lave el organizador diario con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el organizador diario o recordatorio, aunque haya utilizado guantes..
  - Si le queda fostamatinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar fostamatinib apropiadamente.
  - Si está viajando, coloque el envase de fostamatinib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

### Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que fostamatinib puede permanecer en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomar fostamatinib, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
  - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
  - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
  - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento fostamatinib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

### Interacciones con medicamentos y alimentos

- Fostamatinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- La toronja o jugo de toronja podría interactuar con fostamatinib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## FOSTAMATINIB

### Efectos Secundarios de Fostamatinib

Los efectos secundarios que experimentan más del 30% de los pacientes que toman fostamatinib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

| Possible Efecto Secundario                         | Manejo  |
|--|---|
| <b>Diarrea (evacuaciones sueltas y/o urgentes)</b> | <p>Monitoree la cantidad de evacuaciones que tiene al día.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Beba 8-10 vasos de agua/ líquidos cada día, a menos que su proveedor de salud le haya indicado limitar su ingesta de líquidos.</li><li>• Coma comidas pequeñas y frecuentes a lo largo del día en lugar de pocas comidas grandes.</li><li>• Coma alimentos suaves y bajos en fibra (como bananas, puré de manzana, papas, pollo, arroz y tostadas)</li><li>• Evite alimentos ricos en fibra, como frutas y vegetales crudos y cereales integrales.</li><li>• Evite los alimentos que provocan gases, como el brócoli y los frijoles.</li><li>• Evite los alimentos que contengan lactosa, como el yogur y la leche.</li><li>• Evite los alimentos picantes, fritos y grasosos.</li></ul> <p>Comuníquese con su médico si ocurre algo de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La cantidad de evacuaciones sueltas que tiene en un día aumenta por 4 o más.</li><li>• Se siente mareado o aturdido.</li></ul> <p>Su proveedor de salud le puede recomendar un medicamento de venta libre (sin receta médica) llamado loperamida (Imodium®) para ayudar con la diarrea, pero hable con su proveedor de salud antes de comenzar a tomar este medicamento.</p> |

### Efectos secundarios severos de fostamatinib

- ❑ Fostamatinib puede causar neutropenia. La neutropenia sucede cuando hay muy pocos neutrófilos, que son un tipo de glóbulo blanco. Los neutrófilos son importantes para combatir enfermedades causadas por gérmenes. Hable con su equipo médico para saber cuándo debe hacerse análisis de sangre para monitorear sus neutrófilos. Busque atención médica si tiene fiebre de más de 38 °C (100.4 °F).
- ❑ Su presión sanguínea podría elevarse mientras toma fostamatinib. Tómese la presión sanguínea regularmente e informe a su equipo de salud sobre cualquier aumento importante de su presión sanguínea.
- ❑ Fostamatinib podría ser dañino para su hígado. Busque atención médica si nota descoloración amarillenta de su piel o de la parte blanca de sus ojos, si su orina se ve oscura o marrón, si nota sangrado o moretones.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente.

### (INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

### Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- ❑ Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman fostamatinib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 30 días después de la última dosis de fostamatinib.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## FOSTAMATINIB

- No amamante mientras toma fostamatinib y por 30 días después de la última dosis de fostamatinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma fostamatinib y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

### Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su fostamatinib.

\_\_\_\_\_ (INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

### Recursos adicionales

**Página web del producto:** <https://tavalisse.com>

**Información de prescripción del producto:** <https://www.tavalissehcp.com/downloads/pdf/TAVALISSE-Full-Prescribing-Information.pdf>

**Recursos del producto:** <https://www.tavalisse.com/support>

**Actualizado – Enero 4, 2023**

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

**Aviso importante:** The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

**Permiso:** Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a [Contact@NCODA.org](mailto:Contact@NCODA.org).

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.