

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## GLASDEGIB

### Nombre de su medicamento

Nombre genérico — glasdegib (glas-DEH-gib)  
Nombre de marca — Daurismo® (DOOR-is-moe)

### Usos aprobados

Glasdegib se usa para tratar leucemia mieloide aguda (AML) en combinación con otras quimioterapias.  
Glasdegib también se puede usar para otros tratamientos.

### Dosis y administración

Es importante tomar glasdegib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de glasdegib es 100 miligramos (100 mg) tomados por boca a una hora programada, una vez al día.
- Glasdegib se puede tomar con o sin comida, pero a la misma hora cada día.
- Glasdegib se debe tomar entero y no triturado, cortado, o disuelto. Si usted no puede tragar glasdegib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico para otras posibles opciones.
- Si olvida una dosis de glasdegib, puede tomar la dosis lo más pronto posible, siempre y cuando sean 12 horas antes de su próxima dosis. **No** tome dos dosis dentro de 12 horas.

### Interacciones con medicamentos y alimentos

- Glasdegib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales que esté tomando.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos, suplementos, o recibir alguna vacuna.
- La toronja o jugo de toronja podría interactuar con glasdegib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento.

### Almacenamiento y manejo

Maneje glasdegib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde glasdegib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga glasdegib lejos del alcance de niños y mascotas.
- Deje glasdegib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.
- Cuando sea posible, administre glasdegib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra glasdegib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
  1. Lávese las manos con jabón y agua.



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## GLASDEGIB

2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
  3. Cuidadosamente transfiera glasdegib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
  4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
  5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
  6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
  7. Lávese las manos con jabón y agua.
- Si usa un organizador diario o recordatorio para su medicamento, debe usar uno separado para glasdegib. **No** mezcle otros medicamentos con glasdegib. La persona que llenará el organizador diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el organizador diario o recordatorio). Cuando esté vacío, lave el organizador diario con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el organizador diario o recordatorio, aunque haya utilizado guantes.
  - Si le queda glasdegib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o por el inodoro. ush it down the sink or toilet. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar glasdegib apropiadamente.
  - Si está viajando, coloque su glasdegib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.



## GLASDEGIB

### Side Effects of Glasdegib

Los efectos secundarios que experimentan más del 30% de los pacientes que toman glasdegib se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Cambios en la función de los riñones</b></p>	<p>La función de sus riñones (función renal) será evaluada periódicamente a través de una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disminución de la cantidad de orina</li> <li>• Hinchazón inusual de las piernas y los pies</li> </ul>
<p>Cambios en electrolitos y otros valores de laboratorio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajo nivel de sodio</li> <li>• Bajo nivel de magnesio</li> </ul>	<p>Podrán ocurrir algunos cambios en sus valores de laboratorios, los cuales serán monitoreados a través de una prueba simple de sangre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si los cambios son leves, usted no necesariamente sentirá síntomas y usualmente no son una señal de un problema más serio.</li> <li>• Algunos cambios más severos pueden ocurrir, los cuales sí pueden ser una señal de un problema más serio.</li> </ul> <p>Notifique a su proveedor de salud si siente alguno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Molestias en el pecho</li> <li>• Debilidad o fatiga</li> <li>• Nuevos dolores o molestias</li> <li>• Dolor de cabeza</li> <li>• Mareos</li> <li>• Hinchazón de las piernas o los pies</li> <li>• Orina de color rojo o marrón</li> </ul>
<p><b>Disminución en la hemoglobina, la parte de las células rojas de la sangre que transporta hierro y oxígeno</b></p>	<p>Su hemoglobina debe ser monitoreada a través de una prueba simple de sangre. Cuando su hemoglobina está baja, podrá notar cansancio o fatiga más frecuente de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trate de dormir 7-8 horas cada noche.</li> <li>• Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.</li> <li>• Encuentre un balance entre “trabajo” y “descanso”.</li> <li>• Manténgase lo más activo posible, pero también está bien descansar cuando necesite.</li> <li>• Note si se ve más pálido o pálida de lo usual.</li> </ul> <p>Informe a su proveedor de salud inmediatamente si siente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dificultad para respirar</li> <li>• Mareos</li> <li>• Palpitaciones</li> </ul>

Continúa en la próxima página

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## GLASDEGIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Disminución en el número de plaquetas y aumento en el riesgo de sangrado</b></p>	<p>Sus plaquetas deben ser monitoreadas a través de pruebas simples de sangre. Cuando están bajas, puede que presente moretones o que sangre más fácil de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tenga cuidado para evitar moretones, cortaduras, o quemaduras.</li> <li>• Sople su nariz con cuidado y no se rasque la nariz.</li> <li>• Cepille sus dientes con cuidado, con un cepillo suave y mantenga una buena higiene oral.</li> <li>• Cuando se afeite, utilice una rasuradora eléctrica, en vez de navajas.</li> <li>• Utilice una lima de uñas en lugar de un cortaúñas.</li> </ul> <p>Llame a su proveedor de salud si usted no para de sangrar. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangrado por la nariz que dura más de 5 minutos, a pesar de aplicar presión.</li> <li>• Una cortadura que continúa drenando, a pesar de aplicar presión.</li> <li>• Sangrado excesivo de la encía cuando se pasa el hilo dental o se cepilla los dientes.</li> </ul> <p>Busque atención médica inmediatamente si presenta dolor de cabeza severo, sangre en la orina o en las heces fecales, si está tosiendo sangre, o si hay sangrado prolongado e incontrolable.</p> <p><b>Puede que tenga que detener su medicamento antes de un procedimiento médico o dental. Hable con su proveedor de salud o su dentista antes de cualquier procedimiento.</b></p>
<p><b>Fatiga</b></p>	<p>Usted podrá sentirse más cansado de lo usual, o tener menos energía.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse si lo necesita.</li> <li>• Intente realizar actividades físicas todos los días:</li> <li>• Planifique sus actividades y hágalas en el momento del día en el que siente más energías.</li> <li>• Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio.</li> </ul>
<p><b>Disminución de glóbulos blancos y aumento en el riesgo de infecciones</b></p>	<p>Sus glóbulos blancos serán monitoreados a través de pruebas simples de sangre. Cuando los glóbulos blancos están bajos, usted tiene un mayor riesgo mayor a desarrollar una infección. Tome las siguientes precauciones para protegerse de una infección:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lave sus manos a menudo, especialmente antes de comer y después de usar el baño.</li> <li>• Evite las multitudes y las personas con fiebre, influenza, u otra infección.</li> <li>• Báñese regularmente para mantener una buena higiene personal.</li> </ul> <p>Contacte a su proveedor de salud si presenta alguna señal o síntoma de una infección, como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiebre (temperatura de más de 100.4F o 38C)</li> <li>• Escalofríos</li> <li>• Dolor o molestia en la garganta</li> <li>• Ardor al orinar</li> <li>• Cansancio inusual</li> <li>• Una herida que se enrojece, que está drenando, o que no sana</li> </ul> <p>Consulte con su médico antes de tomar un medicamento para la fiebre o escalofríos.</p>

*Continúa en la próxima página*

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



## GLASDEGIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p><b>Retención de fluido o hinchazón</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se mantenga de pie por períodos largos de tiempo.</li> <li>Mantenga sus piernas elevadas mientras esté sentado o acostado.</li> <li>Trate de evitar comidas saladas, ya que estas pueden aumentar la hinchazón.</li> <li>Evite usar ropa apretada y zapatos apretados.</li> <li>Tome su peso diariamente.</li> </ul> <p>Contacte a su proveedor de salud si nota lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hinchazón en las manos, pies, o piernas.</li> <li>Si siente dificultad al respirar.</li> <li>Aumento de 5 libras o más en una semana.</li> </ul>
<p><b>Dolor muscular o en las articulaciones</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenga un diario de su dolor (o espasmos), incluyendo una descripción de cuándo y dónde ocurre el dolor, cómo se siente y cuánto tiempo dura.</li> <li>Manténgase lo más activo o activa posible, pero descanse de ser necesario.</li> <li>Dígale a su proveedor de salud si el dolor (o los espasmos) le interrumpe sus actividades diarias.</li> </ul> <p>Si el dolor le molesta, pregunte a su proveedor de salud qué podría ayudarle. Solamente tome medicamentos para el dolor que sean recetados o recomendados por su proveedor de salud.</p>

### Efectos secundarios severos de glasdegib

- No done sangre o productos sanguíneos mientras toma glasdegib y por al menos 30 días después de su última dosis.
- Los cambios en la actividad eléctrica del corazón se llaman prolongación del intervalo QT. Notifique a su proveedor de salud inmediatamente si siente mareos, debilidad, si se desmaya, o si siente que su corazón late de forma irregular o rápido mientras toma glasdegib.
- Glasdegib puede causar defectos serios de nacimiento. No tome glasdegib si está o piensa que podría estar embarazada.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente:

**(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)**

### Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que glasdegib puede permanecer en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomar glasdegib, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
  - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
  - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
  - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## GLASDEGIB

- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento glasdegib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

### Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman glasdegib. Los hombres y las mujeres con potencial y edad fértil deben utilizar anticoncepción efectiva durante el tratamiento y por un mínimo de 30 días después de la última dosis de glasdegib.
- No amamante mientras tom glasdegib y por 30 días después de la última dosis de glasdegib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro abrazar y dar besos. Es posible que se necesiten precauciones especiales para actividades sexuales mientras usted toma quimioterapias orales y se le recomienda que pregunte a su proveedor de salud.

### Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su glasdegib.

\_\_\_\_\_ (INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

### Recursos adicionales

**Información de prescripción del producto:** <https://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=11336>

**Actualizado – Febrero 14, 2023**

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---

# EDUCACIÓN SOBRE MEDICAMENTOS ORALES CONTRA EL CÁNCER



PASSION FOR PATIENTS  
NCODA.ORG



## GLASDEGIB

**Aviso importante:** The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

**Permiso:** Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a [Contact@NCODA.org](mailto:Contact@NCODA.org).

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.