

EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



LORLATINIB

Nombre de su medicamento

Nombre genérico — lorlatinib (lor-LA-tih-nib)
Nombre de marca — Lorbrena® (lor-BREH-nuh)

Usos comunes

Lorlatinib se usa para tratar cáncer del pulmón de células no pequeñas metastásico que presenta una mutación genética llamada linfoma anaplásico quinasa.

Dosis y administración

Es importante tomar lorlatinib según las instrucciones recomendadas para que su tratamiento sea lo más efectivo posible, por lo que aquí hay algunos puntos importantes para recordar:

- Su dosis puede variar, pero la dosis usual de lorlatinib es 100 miligramos (100 mg) tomados por boca a una hora programada, una vez al día.
- Lorlatinib se puede tomar con o sin comida, pero a la misma hora cada día.
- Lorlatinib se debe tomar entero y no triturado, cortado o disuelto. Si usted no puede tragar lorlatinib, hable con su proveedor de salud o farmacéutico para posibles opciones.
- Si olvida una dosis de lorlatinib, siga estas instrucciones:
 - Tome la dosis omitida, a menos que la siguiente dosis sea dentro de las próximas cuatro horas.
 - No tome dos dosis al mismo tiempo.
 - Asegúrese de anotar si omite una dosis e informe a su proveedor de salud sobre cualquier dosis omitida.

Interacciones con medicamentos y alimentos

- Lorlatinib tiene muchas interacciones con otros medicamentos. Informe a sus proveedores de salud sobre todos sus medicamentos recetados, medicamentos sin receta, vitaminas y productos herbales.
- La toronja o jugo de toronja podría interactuar con lorlatinib; evite comer o tomarlo durante su tratamiento con lorlatinib.
- Hable con su proveedor de salud o farmacéutico antes de comenzar a tomar nuevos medicamentos o suplementos, o recibir cualquier vacuna

Almacenamiento y manejo

Maneje lorlatinib con cuidado. Al igual que las quimioterapias administradas por vena, este medicamento puede ser tóxico y la exposición de otras personas a este medicamento debe ser limitada.

- Guarde lorlatinib a temperatura ambiente (68°F–77°F) en un lugar seco, protegido de la luz.
- Mantenga lorlatinib lejos del alcance de niños y mascotas.
- Deje lorlatinib en el envase proporcionado hasta que esté listo para tomarlo.

EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



LORLATINIB

- Cuando sea posible, administre lorlatinib usted mismo siguiendo los pasos a continuación. Si un familiar, amigo o cuidador le administra lorlatinib, también tendrá que seguir los siguientes pasos:
 1. Lávese las manos con jabón y agua.
 2. Utilice guantes para evitar tocar el medicamento (no es necesario utilizar guantes si usted mismo se administra el medicamento).
 3. Cuidadosamente transfiera lorlatinib de su empaque original a un envase pequeño de medicina u otro desechable.
 4. Administre el medicamento inmediatamente por la boca con agua.
 5. Quítese los guantes y no los utilice para nada más.
 6. Tire los guantes y el envase pequeño de medicina en la basura.
 7. Lávese las manos con jabón y agua.
- Si usa un organizador diario o recordatorio para su medicamento, contacte a su equipo de salud antes de usarlo:
 - La persona que llenará el organizador diario o recordatorio debe utilizar guantes (no es necesario utilizar guantes si usted mismo llena el organizador diario o recordatorio).
 - Cuando esté vacío, lave el organizador diario con jabón y agua antes de volver a llenarlo. Asegúrese de lavarse sus manos con jabón y agua luego de llenar el organizador diario o recordatorio, aunque haya utilizado guantes.
- Si le queda lorlatinib sin utilizar, **no** lo tire en la basura y **no** lo tire por el lavamanos o inodoro. Hable con su proveedor de salud o farmacéutico sobre cómo desechar lorlatinib.
- Si está viajando, coloque el empaque de lorlatinib en un bolso plástico sellado. Pregunte a su farmacéutico si debe tomar precauciones de viaje adicionales.

Efectos Secundarios de Lorlatinib

Los efectos secundarios que experimentan aproximadamente un tercio o más de los pacientes que toman XX se encuentran en el lado izquierdo de esta tabla. Usted **NO NECESARIAMENTE** sentirá estos efectos secundarios. Algunas opciones para manejar los efectos secundarios que sí ocurran, están incluidas en el lado derecho de esta tabla. Estos deben ser dialogados con su proveedor de salud. Si usted siente algún efecto secundario que no puede manejar o que no esté en esta tabla, contacte a su proveedor de salud.

Posible Efecto Secundario

Manejo

Retención de fluido o hinchazón

- No se mantenga de pie por períodos largos de tiempo.
- Mantenga sus piernas elevadas mientras esté sentado o acostado.
- Trate de evitar comidas saladas, ya que estas pueden aumentar la hinchazón.
- Evite usar ropa apretada y zapatos apretados.
- Tome su peso diariamente.

Contacte a su proveedor de salud si nota lo siguiente:

- Hinchazón en las manos, pies, o piernas.
- Si siente dificultad al respirar.
- Si usted ha aumentado 5 libras o más en una semana.

Continúa en la próxima página

EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



LORLATINIB

Posible Efecto Secundario	Manejo
<p>Cambios en electrolitos y otros valores de laboratorio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alto nivel de colesterol • Alto nivel de triglicéridos • Alto nivel de glucosa • Baja albúmina • Aumento de la creatina fosfoquinasa 	<p>Podrán ocurrir algunos cambios en sus valores de laboratorios, los cuales serán monitoreados a través de una prueba simple de sangre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si los cambios son leves, usted no necesariamente sentirá síntomas y usualmente no son una señal de un problema más serio. • Algunos cambios más severos pueden ocurrir, los cuales sí pueden ser una señal de un problema más serio. <p>Notifique a su proveedor de salud si siente alguno de los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para respirar • Molestias en el pecho • Debilidad o fatiga • Nuevos dolores o molestias • Dolor de cabeza • Mareos • Hinchazón de las piernas o los pies • Orina de color rojo o marrón
<p>Disminución en la hemoglobina, la parte de las células rojas de la sangre que transporta hierro y oxígeno</p>	<p>Su hemoglobina debe ser monitoreada a través de una prueba simple de sangre. Cuando su hemoglobina está baja, podrá notar cansancio o fatiga más frecuente de lo usual.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trate de dormir 7-8 horas cada noche. • Evite operar maquinaria pesada si siente mucho cansancio. • Encuentre un balance entre “trabajo” y “descanso”. • Manténgase lo más activo posible, pero también está bien descansar cuando necesite. • Note si se ve más pálido o pálida de lo usual. <p>Informe a su proveedor de salud inmediatamente si siente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para respirar • Mareos • Palpitaciones
<p>Adormecimiento u hormigueo en las manos y pies</p>	<p>Reporte cualquier cambio en su sentido del tacto, co-mo ardor, dolor en la piel, o debilidad.</p>
<p>Cambios en la función del hígado</p>	<p>La función de su hígado será evaluada periódicamente con una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Coloración amarillenta de la piel o de los ojos • Orina oscura o marrón • Sangrado o moretones inusuales
<p>Cambios en la función de los riñones</p>	<p>La función de sus riñones (función renal) será evaluada periódicamente a través de una prueba de sangre simple. Contacte a su proveedor de salud si nota alguno de los siguientes cambios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disminución de la cantidad de orina • Hinchazón inusual de las piernas y los pies

EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



LORLATINIB

Efectos secundarios severos

- Lorlatinib puede causar cambios en sus latidos del corazón o en su ritmo cardiaco. Su proveedor de salud debe verificar su ritmo cardíaco antes de comenzar a tomar lorlatinib y durante el tratamiento. Informe de inmediato a su proveedor de salud si se siente mareado o se desmaya, o si tiene latidos cardíacos anormales.
- Lorlatinib puede causar problemas pulmonares y respiratorios. Informe de inmediato a su proveedor de salud si tiene tos nueva o que empeora, dificultad para respirar, dolor en el pecho, fiebre, o sibilancias.
- Lorlatinib puede causar problemas en el cerebro. Informe a su proveedor de salud sobre cualquier cambio en el pensamiento, en el estado de ánimo, en el habla, la vista o en su audición.
- Usted podría tener la presión sanguínea alta mientras toma lorlatinib. Tómese la presión sanguínea regularmente e informe a su equipo de salud sobre cualquier aumento significativo en su presión sanguínea.
- Lorlatinib puede causar toxicidad en el sistema nervioso central. Usted podría sentirse más cansado de lo usual, podría notar cambios en su estado de ánimo, en el habla o en el sueño. Si usted ha experimentado convulsiones, lorlatinib puede aumentar las probabilidades de que sufra una convulsión. Busque atención médica de inmediato si tiene síntomas de convulsiones.

Si usted siente CUALQUIER efecto secundario que no puede manejar, llame a su doctor o centro de salud inmediatamente:

(INFORMACIÓN DE CONTACTO INSTITUCIONAL)

Manejo de fluidos corporales y desechos

Debido a que lorlatinib permanece en su cuerpo por varios días después de tomarlo, el medicamento puede estar presente en su orina, heces, sudor, o vómito. Al comenzar a tomar lorlatinib, es importante que siga las instrucciones a continuación todos los días hasta terminar su tratamiento. Esto mantendrá a usted, sus seres queridos y el ambiente lo más seguros posible.

- Mujeres embarazadas deben evitar tocar cualquier cosa que pueda estar sucia con fluidos corporales del paciente.
- Inodoros y sistemas sépticos
 - Usted puede utilizar el mismo inodoro, tanque séptico o alcantarillado que utiliza siempre. Si tiene un inodoro de baja presión, cierre la tapa y descárguelo dos veces para asegurar que todos los desechos hayan sido descartados.
 - Si el inodoro o el asiento se ensucia con orina, heces o vómito, limpie las superficies antes de que otra persona lo use.
 - Lávese las manos con jabón y agua después de usar el baño.
- Si usted necesita una bacinilla para la cama, asegúrese de que su cuidador utilice guantes para asistirle con la limpieza y para enjuagar la bacinilla con jabón y agua todos los días.
- Si usted no tiene buen control de su vejiga o intestinal, utilice una toalla desechable con cubierta de plástico, un pañal o sábana para absorber cualquier desecho corporal.
- Lave con jabón y agua la piel que ha sido expuesta a desechos corporales o al medicamento lorlatinib.
- La ropa, sábanas o ropa de cama sucia con fluidos o desechos corporales del paciente deben ser lavados separados de otra ropa o ropa de cama. Si no tiene lavadora, coloque la ropa en bolsos plásticos hasta que puedan ser lavados.
- Lávese las manos con jabón y agua después de tocar cualquier ropa, sábanas o ropa de cama que pueda estar sucia con fluidos corporales.

EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



LORLATINIB

Embarazo, actividad sexual y anticoncepción

- Las mujeres no deben quedar embarazadas y los hombres no deben embarazar a su pareja mientras toman lorlatinib.
- Los anticonceptivos orales y otros métodos hormonales para anticoncepción pueden que no sean efectivos mientras esté tomando lorlatinib. Las mujeres con potencial reproductivo deben utilizar un método anticonceptivo no hormonal efectivo durante la terapia y por un mínimo de seis meses después de la última dosis lorlatinib. Hombres con parejas mujeres en potencial reproductivo deben utilizar un método anticonceptivo efectivo durante la terapia y por un mínimo de tres meses después de la última dosis de lorlatinib.
- No amamante mientras toma lorlatinib y por siete días después de su última dosis de lorlatinib.
- Por favor, informe a su proveedor de salud si usted queda embarazada.
- Es seguro besar y abrazar. Precauciones especiales pueden ser necesarias para la actividad sexual mientras esté tomando lorlatinib y se recomienda preguntarle a su proveedor de salud.

Para obtener su medicamento

- Hable con su proveedor de salud sobre cómo obtener su lorlatinib.

_____ (INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA FARMACIA O FARMACIA ESPECIALIZADA)

Recursos adicionales

Página web del producto: <https://www.lorbrena.com>

Información de prescripción: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/210868s000lbl.pdf

Recursos del produco: <https://www.lorbrena.com/personalized-support>

Actualizado – Marzo 7, 2022

Instrucciones adicionales

EDUCACIÓN SOBRE QUIMIOTERAPIA ORAL



PASSION FOR PATIENTS
NCODA.ORG



LORLATINIB

Aviso importante: The Association of Community Cancer Centers (ACCC), Hematology/Oncology Pharmacy Association (HOPA), National Community Oncology Dispensing Association, Inc. (NCODA) y Oncology Nursing Society (ONS) han colaborado en la recopilación de información y desarrollo de esta guía educativa para el paciente. Esta guía representa un breve resumen del medicamento derivado de la información proporcionada por el fabricante del medicamento y otros recursos. Esta guía no cubre toda la información existente relacionada con los posibles usos, instrucciones, dosis, precauciones, advertencias, interacciones, efectos adversos o riesgos asociados con este medicamento y no debe sustituir la recomendación de un profesional de la salud. La provisión de esta guía es solo para fines informativos y no constituye ni implica respaldo, recomendación o favorecimiento de este medicamento por parte de ACCC, HOPA, NCODA u ONS, quienes no se responsabilizan y no pueden garantizar la exactitud de la información presentada. Los colaboradores no están haciendo ninguna representación con respecto a los medicamentos, y cada decisión, con respecto a dichos medicamentos, son a riesgo exclusivo de la persona que lo consume. Todas las decisiones relacionadas al consumo de este medicamento deben tomarse con la guía y bajo la dirección de un profesional de la salud calificado. Este recurso educativo ha sido traducido de la versión original en inglés para comodidad del público que no lee inglés, pero debido a los matices en la traducción a un idioma extranjero, pueden existir ligeras diferencias. This education resource has been translated from the original English language version as a convenience to the non-English-reading public but due to the nuances in translating to a foreign language, slight differences may exist.

Permiso: Las hojas de educación sobre quimioterapia oral (OCE) se proporcionan como un recurso educativo gratuito para los pacientes con cáncer que necesitan información concisa y fácil de entender sobre los medicamentos orales contra el cáncer. Los proveedores de atención médica pueden copiar y distribuir las hojas a los pacientes, así como dirigir a los pacientes al sitio web de OCE para obtener información. Sin embargo, la reproducción o reutilización comercial, así como el cambio de marcas o la publicación de cualquier tipo, están estrictamente prohibidos sin el permiso del titular de los derechos de autor. Envíe por correo electrónico las solicitudes de permiso y las consultas sobre licencias a Contact@NCODA.org.

Copyright © 2023 by NCODA. All rights reserved.